

Bonsai Barbados Cherry (Malpighia)

AVERTISSEMENT :

Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.

Barbados cherry bonsai:

Le cerisier de la Barbade, ou Malpighia, est un petit arbre tropical qui est devenu de plus en plus populaire dans le monde du bonsaï. Il est connu pour ses fleurs vibrantes et ses fruits comestibles. Malgré ses origines tropicales, avec des soins appropriés, ce bonsaï peut prospérer sous différents climats.

Emplacement

Le bonsaï Barbados Cherry prospère dans des conditions chaudes et ensoleillées, reflétant ses origines tropicales. Il doit être placé dans un endroit où il reçoit beaucoup de soleil, idéalement de six à huit heures de soleil direct chaque jour. Dans les climats plus froids, il est important de rentrer le bonsaï à l'intérieur ou dans une serre pendant les mois d'hiver, car il ne tolère pas le gel. S'il est conservé à l'intérieur, placez le bonsaï près d'une fenêtre lumineuse où il peut recevoir suffisamment de lumière, ou utilisez des lampes de culture.

Arrosage

Le bonsaï Malpighia préfère un sol constamment humide, mais il est en même temps sensible à un arrosage excessif, ce qui peut entraîner la pourriture des racines. Arrosez abondamment votre bonsaï lorsque la surface du sol est sec au toucher. Pendant la saison de croissance (printemps et été), des arrosages plus fréquents peuvent être nécessaires, surtout si le bonsaï est conservé dans un endroit chaud et ensoleillé. En hiver, réduisez légèrement les arrosages, permettant au sol de sécher un peu plus entre les arrosages.

Fertilisation

Pour soutenir la croissance et la fructification saines de votre bonsaï Cerisier de la Barbade, une fertilisation régulière est essentielle. Utilisez un engrais équilibré et soluble dans l'eau toutes les deux semaines pendant la saison de croissance. Un engrais riche en azote est bénéfique au printemps pour favoriser la croissance du feuillage, tandis qu'un engrais plus riche en phosphore peut être utilisé à la fin de l'été pour favoriser la floraison et le développement des fruits. Pendant les mois d'hiver, réduisez ou arrêtez la fertilisation, car la croissance de la plante ralentit.

Taille et ligature

La taille est nécessaire pour conserver la forme. Le meilleur moment pour tailler est au début du printemps, avant le début de la nouvelle croissance. Coupez régulièrement les longues pousses pour favoriser une forme plus compacte et conserver la forme souhaitée du bonsaï. La tendance naturelle de la plante à produire un feuillage dense facilite la création d'un bonsaï luxuriant et bien équilibré. Le fil de bonsaï peut être utilisé pour façonner les branches, mais il faut faire attention car les branches sont relativement cassantes. Il est préférable de ligaturer les jeunes branches lorsqu'elles sont encore flexibles. Appliquez le fil avec précaution et surveillez-le régulièrement pour éviter de cicatiser l'écorce. Retirez le fil après quelques mois, une fois les branches prises dans la position souhaitée.

Rempotage

Rempoter votre bonsaï Malpighia tous les deux à trois ans est important pour rafraîchir le sol et éviter que les racines ne restent coincées dans le pot. Le meilleur moment pour rempoter est au début du printemps, juste avant le début de la saison de croissance. Utilisez un substrat pour bonsaï bien drainé et taillez environ un tiers de la masse racinaire pour favoriser la croissance saine de nouvelles racines. Après le rempotage, arrosez abondamment le bonsaï et conservez-le dans un endroit ombragé pendant quelques semaines pour permettre aux racines de récupérer.

Propagation

Il peut être multiplié par graines ou par boutures. La propagation des graines peut être lente, mais c'est un processus gratifiant si vous êtes patient. Les graines doivent être trempées dans de l'eau tiède pendant 24 heures avant la plantation pour favoriser la germination. Les boutures de résineux, prélevées à la fin du printemps ou au début de l'été, sont une méthode plus courante. Pour se propager par boutures, prenez une section de 4 à 6 pouces de nouvelle pousse, trempez-la dans l'hormone d'enracinement et plantez-la dans un mélange de sol bien drainé. Gardez la bouture humide et dans un endroit ombragé jusqu'à ce que les racines se développent.

Ravageurs et maladies

Le bonsaï Cerisier de la Barbade est généralement résistant mais peut être sensible aux ravageurs et maladies courants. Des ravageurs tels que les pucerons, les tétranyques et les aleurodes peuvent occasionnellement infester la plante. Ceux-ci peuvent être gérés avec du savon insecticide ou de l'huile de neem. Des maladies fongiques comme l'oïdium peuvent également survenir, surtout dans des conditions humides. Pour prévenir les infections fongiques, assurez une bonne circulation de l'air autour du bonsaï, évitez les arrosages en hauteur et utilisez un fongicide si nécessaire.