

# Bonsai Érable du Japon

## ( Acer palmatum)

### AVERTISSEMENT :

**Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.**

L'érable du Japon, également connu sous son nom latin *acer palmatum*, est un petit arbre venu d'Extrême-Orient qui fascine par le flamboiement de son feuillage automnal. Ses feuilles caduques et palmées, dotées de 5 pointes, le distinguent des autres espèces d'érable. Sous forme de bonsaï, l'érable du Japon offre de très bons résultats, à condition de lui apporter des soins adaptés et une taille judicieuse.

### *Description du Bonsaï Erable du Japon*

- **Nom latin** : acer palmatum
- **Synonymes** : érable palmé du Japon, érable palmé
- **Famille** : Acéracées
- **Origine** : Japon, Chine, Corée
- **Type de plante** : arbre
- **Type de végétation** : pérenne
- **Type de feuillage** : caduc

### **Caractéristiques du Bonsaï Erable du Japon**

Le bonsaï érable du Japon est issu de la grande famille des Acéracées, qui ne compte pas moins de 200 espèces d'arbres et arbustes à feuilles caduques. La couleur des feuilles du bonsaï acer palmatum varie en fonction des espèces. On considère généralement que les individus présentant un feuillage vert en été sont plus résistants que les variétés à feuillage rouge. Les feuilles de ce petit arbre présentent 5 lobes pointus à l'extrémité.

Les fleurs et les fruits de ce bonsaï sont assez anecdotiques. En automne, de **petites baies rouge-brun apparaissent deux par deux**, se confondant souvent avec son feuillage. L'intérêt de l'érable du Japon est qu'il se plie aisément aux techniques du bonsaï. Les bonsaïstes apprécient tout autant **la couleur ardente de son feuillage** que la structure de ses branches. Dans un sol frais et légèrement acide, exposé à **mi-ombre** ou **en plein soleil** selon les saisons, l'acer palmatum s'épanouira pleinement.

## **Comment entretenir le Bonsaï Erable du Japon ?**

Exposition Mi-ombre sauf au printemps / automne

Arrosage Soutenu

Engrais Chaque mois sauf Juillet et Août  
Engrais organique spécial bonzaï

Croissance N/A

Maladies Pucerons

Exposition / Emplacement

Sauf au **printemps** ou à **l'automne** où l'on pourra le poser **en pleine lumière**, le bonsaï érable du Japon apprécie **les situations mi-ombrées**. Assez rustique, il supporte les températures négatives jusqu'à -10°C, et résiste à la chaleur (jusqu'à 30°C en été).

### **Comment arroser le Bonsaï Erable du Japon ?**

L'arrosage de ce bonsaï doit être **soutenu** car son substrat doit toujours rester frais, surtout au printemps.

### **Quel engrais utiliser ?**

Les jeunes arbustes ont besoin d'un apport en engrais organique spécial bonzaï dès l'apparition des premiers bourgeons, au printemps. La fertilisation peut être plus tardive chez les acers palmatum adultes. En période de végétation, il faut nourrir votre bonsaï chaque mois, sauf en juillet et en août où vous interromprez tout apport.

### **Soins**

Il est possible de mettre en forme votre bonzaï acer palmatum par **ligaturage** : les fils sont alors posés en juin et retirés en août. Évitez de ligaturer votre bonzaï en hiver, car ses branches, plus fragiles, risquent de rompre.

### **Comment le repoter ?**

Il s'effectue tous les ans chez les jeunes bonsaï érables du Japon, tous les deux ans chez les sujets adultes, et au printemps. Préparez un mélange composé de 50 % d'akadama (substrat neutre), de 10 % de kanuma (terre argileuse légèrement acide) et de 40 % de pouzzolane.

Réalisez une taille importante sur le pain racinaire du bonzaï afin de favoriser sa croissance.

## **Multiplication**

3 méthodes de multiplication sont possibles :

- Le bouturage de juin, qui nécessite de sélectionner une bouture d'1 cm de diamètre au maximum ;
- Le marcottage ;
- Le semis.

### **Comment tailler le Bonsaï Érable du Japon ?**

Le travail des entrenœuds s'effectue durant toute la phase végétative, et doit être particulièrement précis si vous désirez éviter des entrenœuds trop longs. La **défoliation de l'arbre** se réalise en **juin**, sous certaines conditions : toujours sur un individu en bonne santé, jamais deux années de suite ou l'année d'un repotage, et jamais sur les espèces à feuillage estival rouge, trop fragiles.

La **taille de structure se réalise de préférence en automne**, juste après la chute des feuilles, ou durant la semi-dormance estivale pour les arbres exposés en hiver. Sauf pour l'érable de Burger (érable trident ou *Acer buergerianum*), la croissance d'un bonsaï érable du Japon est assez **lente**.

### **Maladies et parasites**

Le bonsaï érable du Japon peut être sensible aux **pucerons**, que vous éliminerez avec du savon noir, et à la verticilliose. Cette maladie provoque un dessèchement progressif de l'individu. Il faut alors désinfecter le sol et éviter de poursuivre la culture d'un arbre contaminé.

Des sujets sains et cultivés dans de bonnes conditions développent toutefois rarement cette affection.

Toxicité

Le bonsaï acer palmatum est **non toxique**.

### ***Quelques espèces de Bonsaï Érable du Japon***

En culture de bonsaï, quelques variétés sont à privilégier :

- **l'acer palmatum Arakawa**;
- **l'acer palmatum Deshojo**;
- **l'acer palmatum Seigen**;
- **l'acer palmatum Kiyohime**;
- **l'acer palmatum Shishigashira**, ou encore l'acer palmatum Kashima
- **l'acer palmatum Deshojo** est une variété particulièrement intéressante : passant du rouge ou vert en période végétative, ses feuilles retrouvent leur flamboyance en automne. C'est une espèce très rustique (jusqu'à -22°C), au port buissonnant.